



新加坡  
2019 冠病疫苗  
接种计划

2019 冠病疫苗  
接种须知



## 为什么接种2019冠病疫苗这么重要？

接种2019冠病疫苗有助：

---


保护至亲和社区免受冠病感染

---

新加坡恢复更多活动  
和尽早安全地重新开放边境

---

防止医疗体系不堪负荷



## 什么是2019冠状病毒疾病(COVID-19)?

2019冠状病毒疾病是一种传染性疾病，可通过咳嗽或打喷嚏释放到空气中或落在物体表面的唾液或粘液传播。


其症状包括发烧、咳嗽、呼吸困难、喉咙痛、流鼻涕、失去嗅觉或味觉。年长者或有潜在健康问题的人若感染冠病，可能会引发严重病症。




“ 接种疫苗不单是在保护自己，更是在保护他人，特别是你的至亲。接种疫苗的人越多，病毒就越难在人群中传播开来，我们的社会就更安全。 ”

— 李显龙总理


接种疫苗有助预防冠病。  
接种疫苗的人越多，  
病毒传播的速度就会减缓。






## 2019冠病疫苗是否安全？

获准在新加坡使用的2019冠病疫苗，符合安全和功效标准。其效益比已知风险来得高。卫生科学局与2019冠病疫苗专家团全面评估疫苗临床数据后，才予以批准使用。




## 谁可以接种2019冠病疫苗？


新加坡公民和长期居民可免费接种2019冠病疫苗。医护人员将告知你是否适合接种疫苗。如果你有任何病症（特别是有以下情况），请在接种疫苗前告诉医生或护士：



## 如何接种2019冠病疫苗

我们将逐步为符合资格的人接种2019冠病疫苗。  
当轮到你的时，我们将通知你进行预约及提供你预约指南。  
公众只能通过预约接种疫苗。由于疫苗分批运达我国，  
因此医护人员和较脆弱群体（年长者、从事高风险行业的人）将优先接种。





## 接种2019冠病疫苗是否有任何风险？


与其他疫苗一样，你在接种2019冠病疫苗后，可能会出现一些常见副作用。大多数的副作用都很轻微，而且通常会在数天后逐渐消退。

其常见副作用包括发烧、头痛和肌肉疼痛。

如果你出现这些情况，可以每隔6小时服用一至两片扑热息痛 (paracetamol)。

如果症状持续不见好转，请看医生。

注射部位也可能会疼痛和红肿。



30:00



接种疫苗后，你应留在诊所30分钟，以观察反应。

在极少数情况下，2019冠病疫苗会引起严重过敏反应，例如呼吸困难、脸部、喉咙、眼睛或嘴唇肿胀、心跳急促、头晕、乏力或出现严重皮疹。如果你出现严重过敏反应，请立即拨995或前往邻近的医院急诊部求医。



“让我们在这最后阶段继续努力，  
完成抗疫任务，一起跨过终点线。”

— 李显龙总理

欲知详情，请浏览  
[vaccine.gov.sg](http://vaccine.gov.sg)  
或拨打 1800-333-9999.



出版机构



MINISTRY OF HEALTH  
SINGAPORE

2021年1月