

冠  
疫  
情  
19

专家

# 染疫死亡率比普通人高10倍

## 任何心脏病患者都应接种疫苗



**林艺君 报道** linyijun@sph.com.sg  
 ●24小时新闻热线: 1800-8227288/91918727  
 Wechat/WhatsApp传照片: 91918727

本地心脏病专家指出，任何心脏疾病患者包括冠心病或心衰等，都应该接种新冠疫苗，因心脏病患者感染新冠病毒后的死亡率是普通人的10倍以上。

新加坡国立大学心脏中心总主任及高级顾问医生、新加坡心脏基金主席陈准沁教授接受本报询问时指出，本地早期数据以及不同国家的早期报道显示，很多新冠病毒患者都有慢性疾病，如高血糖、糖尿病和冠心病等。本地首100名新冠病毒患者中，约20%有高血压，10%有糖尿病。

有心脏病病史，无论是冠心病或心衰等，都会增加感染新冠病毒后的死亡率。陈准沁教授说：“若本身患有心脏病，感染新冠病毒后的死亡率是常人的10倍以上。”

由于心脏病患者属高风险群体，陈准沁教授认为他们应当接种疫苗来更好地保护自己免于受到感染而产生严重的并发症。

他指出，在心脏领域，没有一种心脏病是需要排除疫苗接种的，包括那些正在服用药物者，如抗血小板药，接种期间也可照常服用。

除非是本身患有过敏症的心脏病患者，否则接种疫苗对心脏状况没有影响，因此无需在接种期间停用药物。

服用抗凝血药的患者，接种后需注意按压注射部位几分钟即可。

此都建议接种新冠疫苗。(档案照)

▲心脏病专家受访时说，心脏病患者感染新冠病毒的并发症风险更高，因此

### 中老年层死亡率更高

多数心脏病患者属中老年层，死亡率比年轻人来得高。

陈准沁教授指出，感染新冠会直接导致心脏损伤，一项针对新冠病毒患者血液样本中的心肌钙蛋白值研究显示，高达三分之一的新冠患者，都出现肌钙蛋白值升高的症状，代表心肌损伤，或俗称“心肌炎”。

他指出，感冒有时也会出现肌钙蛋白值升高的情况，但绝大多数没有问题。但若本身患有心脏病的高风险患者，肌钙蛋白值升高可导致严重后果，或增加患者死亡率至70%。

因此陈准沁教授表示，任何心脏病患者都可前往接种，不过对病情是否符合接种仍存在疑问者，应咨询家庭医生。

### 任何疫苗都可接种

陈准沁教授说，除非心脏病患者伴随其他严重疾病，如严重过敏、长期卧床不起或免疫力严重受损等情况，否则除了16岁及以下的任何年龄层都适合接种疫苗。

目前市面上有不同种类的新冠病毒疫苗，在本地获紧急批准使用的疫苗有辉瑞和莫德纳新冠病毒疫苗。

问及哪款疫苗最适合心脏病患者，陈准沁教授说，目前没有任何依据表明哪种疫苗对心脏病患者最有效，因此他会建议本地及国外的病患，无论国家提供什么疫苗就去接种。

陈准沁教授将在来临星期五(26日)下午3时至4时，展开“新加坡心脏基金主办线上英语讲座”，重点讲解心脏病患者是否应该注射新冠病毒疫苗的相关课题。有兴趣的人士可登录 [shorturl.at/fkmyR](http://shorturl.at/fkmyR) 观看。

### 国大437人已受检测

国大大学城宿舍的437人已接受新冠病毒检测，目前仍在等待结果出炉。

新加坡国立大学的宿舍污水被检测出含少量的新冠病毒核糖核酸，昨天有大批学生排队等候接受检测。

卫生部昨日更新每日疫情文告指出，污水测试结果于21日出炉，有证据显示可能是有入住者曾经感染新冠病毒，并在康复后排出病毒。

为了安全起见，卫生部昨天展开特别检测行动，检测受影响单位的住宿者，包括新冠康复者，共接受检测，在果受目前仍等待结果出炉，受影响人士在等候期间须自我隔离，避免与他人接触。



你通报 我送奖

1800-8227288

WhatsApp WeChat 9191-8727

最高 \$50 NTUC 礼券



不包括新冠康复者在内，国大共有437人接受检测，目前仍在等待结果。(档案照)